

แจ้งเตือนเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา
เรื่อง การระบอบาดและการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก (12 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ๑๗,๓๐๒ ราย เสียชีวิต ๒๑ ราย อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ ๐.๑๒ โดยคาดว่าโรคไข้เลือดออกจะระบอบาดรุนแรงในปีนี้ ผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๒๑ ราย เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่า ๑๕ ปี ๑๔ ราย (ร้อยละ ๖๗) ซึ่งส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง ได้แก่ โรคอ้วน (BMI > ๓๐ กก./ม.^๒) เบาหวาน โรคหัวใจ โรคเลือด และติดเชื้อรา ผู้ป่วยผู้ใหญ่บางรายถูกวินิจฉัยในครั้งแรกเป็น Sepsis, Gastritis, Peptic ulcer with UGIB, และไข้ไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยกว่าร้อยละ 50 มีประวัติไปซื้อยารับประทานเอง หรือไปฉีดยาลดไข้จากคลินิก แม้จะมีไข้สูงมามากกว่า 2 วัน โดยไม่ได้รับการตรวจสัญญาณชีพ และไม่ได้รับคำแนะนำให้ไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาล

2. ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออก

- 2.1. เด็ก ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่นๆ หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- 2.2. ผู้ใหญ่ ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

ต้อง แนะนำให้ผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ห้าม ง่ายยาลดไข้ประเภท NSAIDs ทั้งชนิดฉีดและรับประทาน

ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทุกสัปดาห์ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย และมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้จาก LINE@Antiyung

